

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

特納用

オクトチアミン配合
ビタミンB₁B₆B₁₂主薬製剤

ノイビタエースEX

ノイビタエースEXの特徴

1. 肩こり、腰痛、手足のしびれ、神経痛の緩和に

肩こり、腰痛、手足のしびれは、神経、筋肉の緊張や自律神経の乱れた時によく見られる症状です。ノイビタエースEXは神経や筋肉の機能維持にかかせない、ビタミンB₁、B₆、B₁₂と血行を促進する天然型ビタミンE、自律神経の乱れをコントロールするγ-オリザノールが効果的にはたらいて、肩こり、腰痛、手足のしびれ、神経痛の不快な症状を改善します。

2. 眼精疲労の緩和に

目の酷使、神経の疲れからくる眼精疲労に効果を発揮します。

3. 肉体疲労時のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給に

肉体疲労時や病中病後には、ビタミンの消費が激しくなり、ビタミン不足になりがちです。なかでもビタミンB₁は体内のエネルギーの産生に欠くことのできないビタミンであり、十分補給することが大切です。ノイビタエースEXは、消化管からの吸収性にすぐれ体内で効率よく作用するビタミンB₁誘導体のオクトチアミンと、それに協力的にはたらくビタミンB₆、B₁₂、ニコチン酸アミドをバランスよく配合していますので、からだの機能を正常に保つのに役立ちます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、口内炎
精神神経系	頭痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

軟便、下痢、便秘

4. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：
筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労、神経痛
「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい」
- 次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2～3錠	1回 水又はお湯で服用して下さい。
11歳以上15歳未満	1～2錠	
7歳以上11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉





- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

本剤は、黄色の糖衣錠で、3錠中に次の成分を含有しています。

オクトチアミン（ビタミンB₁誘導体）…………… 100mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）…………… 100mg
シアノコバラミン（ビタミンB₁₂）…………… 1500μg
コハク酸 *d*-α-トコフェロール（天然型ビタミンE）…………… 100mg
ニコチン酸アミド…………… 60mg
γ-オリザノール…………… 10mg
添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、ケイ酸Ca、セルロース、ステアリン酸Mg、セラック、ヒマシ油、白糖、アラビアゴム、タルク、酸化チタン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リボフラビンリン酸エステルNa、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。  
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）  
- (4) めれた手で取り扱わないで下さい。水分が錠剤につくと、表面が一部溶けて、変色又は色むらを生じることがあります。また、めれた錠剤をビンに戻すと他の錠剤にも影響を与えますので、戻さないで下さい。
- (5) ビンの中の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨てて下さい。
- (6) ビンの中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないで下さい。また、間違って服用しないよう注意して下さい。
- (7) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
ホシエヌ製薬株式会社
奈良県五條市住川町1380番地