

## 第2類医薬品

# マキロン<sup>®</sup>s かゆみどめ液

鎮痒消炎薬

### マキロンsかゆみどめ液の特徴

1. スーッとしたりこちよい清涼感とサラッとした使用感です。
2. 虫さされによるしつこいかゆみにすぐれた効き目をあらわす副腎皮質ホルモン「デキサメタゾン酢酸エステル」が配合されています。
3. 殺菌剤イソプロピルメチルフェノールを配合しています。

### 使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
  - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
  - (2) 目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。
3. 長期連用しないで下さい。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 患部が広範囲の人
  - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 効能・効果

虫さされ、かゆみ

## 使用法


1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

### 〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用して下さい。

### 容器の使い方

容器を逆さまに持って、スポンジ面を数回患部に押しつけ、薬液をスポンジに十分に浸透させて下さい。薬液がスポンジ面に充分浸透していないと、スポンジ面が破れるおそれがありますのでご注意ください。使用後はスポンジの乾燥を防ぐため、必ずキャップをしっかり閉めて下さい。



## 成分・分量

本剤は、液剤で、100mL中に次の成分を含有しています。

デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2g
イソプロピルメチルフェノール	0.1g
<i>l</i> -メントール	3.5g
<i>dl</i> -カンフル	1g

添加物：エタノール

本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないで下さい。
- (5) 車の中など、高温になる場所に長時間放置しないで下さい。容器が変形し、スポンジ部分の脱落や液もれがおこる恐れがあります。
- (6) 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
- (7) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電話 03(5205)8331  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10