

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

第2類医薬品

のみすぎ・食べすぎ・胸やけ・胃痛に

パンシロン[®]

胃腸薬

パンシロンは、制酸剤、消化剤、健胃剤をバランスよく配合。
のみすぎ、食べすぎ、胸やけ、胃痛などによく効きます。

特長

- のみすぎ、食べすぎで疲れた胃に
健胃生薬が弱った胃の働きを回復させるとともに、消化酵素の働きで食物の消化を助け、胃の負担を軽くします。
- 胸やけ、胃痛をスーッと鎮めます。
速効性制酸剤と持続性制酸剤の配合で、胃酸の出すぎからくる胸やけ、胃痛、むかつきなどの不快症状を抑えます。
- 爽やかな香りの、のみやすい細粒です。
生薬独特の爽やかな香りの細粒剤ですから、胃の調子が悪い時でも無理なく服用していただけます。

こんな方にパンシロン。



●つい箸が進んで食べすぎたら、胃がもたれて苦しい



●のみすぎがこたえて、胃がムカムカ

●いつも何となく胃が重苦しくて食欲がない



●時々胃が痛むことがある



●油ものを食べた後はいつまでも胸やけが続く

使用上の注意



■してはいけないこと ☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることもある)
4. 長期連用しないでください。

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。 排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

口のかわき

4.2週間位服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐、飲みすぎ、胃痛、食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べすぎ

用法・用量

次の量を食後に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15才以上	1包	3 回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
5才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

有効成分(3包中)

	有効成分	配合量		有効成分	配合量
制酸剤	サナルミン	399mg	消化酵素	ビオチンアスターゼ500	210mg
	炭酸水素ナトリウム	1950mg		プロザイム	18mg
	重質炭酸マグネシウム	555mg	健胃生薬	ケイヒ	78mg
	沈降炭酸カルシウム	540mg		シユクシャ	144mg
	ロートエキス	30mg		センブリ	3mg
			ケイヒ油	7mg	

添加物として、*l*-メントール、トウモロコシデンプン、デキストリン、ケイ酸Alを含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- (5) 1包を分けて服用したときの残りは、袋の口を折り返して封をするように閉じ、2日以内に使用してください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHT[®] ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

400151408