

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痛消炎 プラスター パスタイン[®] A

第3類
医薬品

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

パスタインAはすぐれた鎮痛
消炎効果のあるプラスター剤
です。

⚠️【使用上の注意】

❌【してはいけないこと】

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

🗨️【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

製造番号

使用期限

【用法・用量】 1日数回患部に貼付してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) はった患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
- (3) 強い刺激を感じることもあるので、入浴の30分以上前にはがしてください。また、入浴後にはる場合は30分位してからはってください。
- (4) 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
- (5) 皮膚の弱い人は、同じところに続けてはらないでください。


【成分・分量】 膏体100g中

サリチル酸グリコール ……4.3g
L-メントール ……6.1g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) ……4.3g
ノニル酸ワニリルアミド ……0.012g
添加物として BHT、生ゴム、水素添加ロジングリセリンエステル、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリブテン、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
5. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

 祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

【お客様相談窓口】TEL.0954-63-1320

受付時間9:00～17:00(土、日、祝日は除く)