

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください  
 また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
 使用期限(パッケージ側面およびチューブ底に記載)を過ぎた製品は  
 使用しないこと

第2類医薬品

外用薬


**アットノン<sup>®</sup>ジェル**

販売名:アットノン  
 非ステロイド剤

**特徴**

傷あととは、傷ができたあと傷口を修復する時に皮ふ組織が異常に増殖することのできる赤み(つっぱり)などやもり上がり(しこり)のことです

1. アットノンは、有効成分ヘパリン類似物質が血流の循環を良くして皮ふの新陳代謝を促進し、皮ふの炎症を鎮めて皮ふ自体の正常化機能を回復させ、角質に水分を保持させ柔軟性を取り戻すことで、傷あとを改善していきます



イメージ図

**① 血行促進作用**

血流の循環を良くして、皮ふの新陳代謝を促進します

**② 抗炎症作用**

皮ふの炎症を鎮めて、皮ふ自体の正常化機能を回復させます

**③ 水分保持作用**

角質に水分を保持させ、柔軟性を取り戻します

2. サラッとした透明ジェルタイプの塗り薬です

**⚠ 使用上の注意**

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
2. 次の部位には使用しないこと 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)



**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効能・効果

きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

## 用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、またはガーゼなどにのぼして貼ってください

<用法・用量に関連する注意>

(1)使用のつどキャップをしっかりとしめること (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (4)外用にのみ使用すること ●出血のある傷口には使用しないこと(血が止まりにくくなることがある) ●顔面にあるやけどのあと・傷あと、かさぶたには使用しないこと

## 成分・分量 100g中

成分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	血行促進作用、抗炎症作用、水分保持作用がある

添加物として、カルボキシビニルポリマー、トリイソプロパノールアミン、プロピレングリコール、イソプロパノール、香料を含有する

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎ **0120-5884-01**

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

10130383