

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

漢方製剤 増田葛根湯エキス顆粒

第2類医薬品

葛根湯は中国後漢の時代に張仲景が著わした中国古医書「傷寒論」及び「金匱要略」に記載されている代表的な漢方処方です。

増田葛根湯エキス顆粒は葛根湯を乾燥エキスとし、これを顆粒にしたのみやすい漢方薬です。

◆◆◆ 増田葛根湯エキス顆粒はつぎのようなときに適しています ◆◆◆

- かぜの初期でくしゃみ、鼻水、鼻づまりがあり、寒気がするとき。
- かぜをひいて悪寒(さむけ)、発熱、頭痛がして、自然発汗(汗ばむこと)がなく、首すじ、肩、背中がこるとき。
- 首すじ、肩、腕、背中にこりや痛みを感じる時。
- 肩がこわばった感じで頭が痛いとき。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

短期間の服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

かぜの初期、鼻かぜ、かぜによる頭痛・肩こり

[用法・用量]

次の量を1日3回食間に水または白湯で服用してください。

年 齢	1 回 量
大人(15才以上)	1 包
15才未満7才以上	$\frac{2}{3}$ 包
7才未満4才以上	$\frac{1}{2}$ 包
4才未満2才以上	$\frac{1}{3}$ 包
2才未満の乳幼児	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

[成分・分量]

3包(大人1日量)中に次の成分を含んでいます。

カッコン湯乾燥エキス 990mg

次のカッコン湯原生薬に相当

カッコン(葛根) 2,329mg	ケイヒ(桂皮) 1,165mg
マオウ(麻黄) 1,747mg	シャクヤク(芍薬) 1,165mg
ショウキョウ(生薑) 582mg	カンゾウ(甘草) 1,165mg
タイソウ(大棗) 1,747mg	

添加物としてD-マンニトール、無水ケイ酸、乳糖、バレিশョデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

■ お問い合わせ先 増田製薬株式会社 お客様相談係 電話 0744-27-4381

[受付時間 9時から17時まで 土、日、祝日を除く]

たい印



製造販売元 増田製薬株式会社
奈良県橿原市川西町429