

# ミトン 鼻炎カプセル

**ミトン 鼻炎カプセル**は鼻みず、鼻づまりを抑え、炎症、頭重を鎮める5種類の成分を配合しています。花粉やハウスダストによるアレルギー性鼻炎、また、季節の変わり目などに起こりがちな不快な鼻炎症状を鎮め、鼻の通りをよくします。

## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないで下さい
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。 前立腺肥大による排尿困難
  - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい  
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
- 長期連用しないで下さい

## 相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 授乳中の人。
  - 高齢者。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。 高熱、排尿困難、むくみ
  - 次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病
  - モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人。
  - かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいて下さい。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振	その他	顔のほてり、異常なまぶしさ
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこぼりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
- 5~6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

裏面に続く

## 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

鼻みず



のどの痛み

頭重



## 用法・用量

1日3回なるべく空腹時をさけ、4時間以上の間隔を置いて服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

おしだす



〈PTPシートの取り出し図〉

### 用法・用量に関連する注意

- 用法・用量を厳守して下さい。
- カプセルの取り出し方  
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

### お問い合わせ先

連絡先 ワキ製薬株式会社 お客様相談室  
住 所 奈良県北葛城郡広陵町南郷898  
電 話 0120-200-114  
受付時間 午前9時から午後5時まで(土、祝日を除く)



## 成分・分量 3カプセル(成人1日量)中

成 分	分量	作 用
クロルフェニラミン マレイン酸塩	6mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり等のアレルギー症状をやわらげます。
塩酸ブソイドエフェドリン	90mg	血管収縮作用により鼻粘膜の充血や腫れをおさえ、鼻づまりを改善します。
ペラドンナルカロイド	0.42mg	鼻の粘膜の分泌を調整し、鼻みずの過剰な分泌をおさえます。
グリチルリチン酸 二カリウム	45mg	鼻粘膜の腫れや充血をしずめ、鼻づまりを改善します。
無水カフェイン	90mg	頭重をやわらげます。

添加物として乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、カプセル本体に着色料(酸化チタン)、プルランを含む。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
- 一度内装(アルミの袋)を開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヶ月以内を目安に、なるべくすみやかに使用して下さい。



製造販売元 **WAKI** ワキ製薬株式会社

〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷898

URL: <http://www.a-kusuri.co.jp/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話: 0120-149-931 (フリーダイヤル)