

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

消炎・鎮痛薬

筋肉痛・腰痛・手首の痛みに

第2類医薬品

# サブベート<sup>®</sup>EX「1%クリーム」

——— インドメタシン製剤 ———

## 特長

- ◎主成分「インドメタシン」が直接的に関節や腰の痛みに作用する非ステロイド系の外用消炎鎮痛剤です。
- ◎のびがよくべとつかずさっぱりとした使い心地のクリーム製剤です。
- ◎*l*-メントールを配合し爽快な使い心地が続きます。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

#### 3. 長期連用しないでください。



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

#### 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能】

筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

(裏面に続く)

## 【用法・用量】

1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

### 《用法・用量に関連する注意》

- (1) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 11歳未満の小児に使用させないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
  - 塗擦部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないでください。
  - 皮膚の特に弱い方は、同じところに続けて塗擦しないでください。
  - 使用部位に他の外用剤を併用しないでください。

## 【成分(100g中)】

成分	含量	はたらき
インドメタシン	1000mg	痛みやはれを抑えます
ℓ-メントール	3000mg	清涼感を与え、痛みをやわらげます

添加物：クロタミトン、ミリスチン酸イソプロピル、ラノリン、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、カルボキシビニルポリマー、カルメロースNa、グリセリン、亜硫酸水素Na、エデト酸Na、pH調節剤

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品のお問い合わせは下記にお願いいたします。

田辺三菱製薬「くすり相談センター」(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)

受付時間:弊社営業日の9:00~17:30



販売元

田辺三菱製薬株式会社

大阪市中央区道修町3-2-10

製造販売元

前田薬品工業株式会社

富山市向新庄町1丁目18番47号