

第2類医薬品

肩こり・筋肉の痛みに!

コランダス
ローションα

フェルビナク3.0%配合

第2類医薬品

フェルビナク3.0%配合
ジンジン爽快!

コランダス
ローションα

肩こり・筋肉の

痛みに!

肩こりに伴う肩の痛み
筋肉痛

肘の痛み

打撲
関節痛

捻挫
腱鞘炎

腰痛

85mL

容量



第2類医薬品

コランダス
ローションα

肩こり・筋肉の痛みに!

保管および取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)火の中に入れてください。
- (6)使用済みの容器は火中に投じないでください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべくすみやかに使用してください。
- (8)使用後はキャップをしっかりと締めてください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

発売元 白金製薬株式会社
〒634-0803
奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室

☎ 0744-21-5588

受付時間

9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803
奈良県橿原市上品寺町515

MADE IN JAPAN



2014年3月改訂 第5版
白金

第2類医薬品

コランダス
ローションα

肩こり・筋肉の痛みに!

効能・効果

腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘等)、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量

1日2~4回、患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (2)ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)塗布した直後に入浴や運動等で汗をかくと、強い刺激を感じることがあります。入浴・運動の前後1時間は使用しないでください。また、刺激が強すぎる時は、石鹸・ベビーオイル等で洗い流すと刺激を緩和出来ます。
- (5)定められた用法・用量を守ってください。

成分・分量

100mL中
フェルビナク……3.0g
添加物としてエタノール、*l*-メントール、ノナン酸パルミトアミド、グリセリン、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、ヒドロキシプロピルセルロース、香料を含有する。



製造番号
使用期限

第2類
医薬品

販売名 コランダスローションα 外用消炎鎮痛剤

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

特長

- 消炎鎮痛成分が直接浸透!
消炎鎮痛成分フェルビナクが皮ふから浸透して、炎症を起こした筋肉や関節に直接働きます。
- ジンジン爽快な使用感で、肩こりに伴う肩の痛みや腰痛を緩和させます。フェルビナクは、痛みや腫れに関係する物質(プロスタグランジン)の産生を抑えます。
- 塗りやすい容器
横向ネックとグリップ型ボトルにより、背中や腰などの手の届きにくいところにも塗りやすい。

⚠ 使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊婦または妊娠していると思われる人。(4)授乳中の人。(5)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむしたむし等または化膿している患部。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください