

〈効能〉
 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

〈用法・用量〉
 成人（15才以上）1回1本、1日2回朝夕、食前又は食間によく振ってから服用する。15才未満は服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉
 (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
 (2) 生薬抽出液剤のため、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

〈成分〉
 成人1日の服用量90mL（45mL×2本）中
 葛根湯抽出液A………60mL
 カッコ8g、マオウ・タイソウ各4g、ケイヒ・シヤクヤク各3g、カンゾウ2g、シヨウキョウ1gより抽出。

（葛根湯抽出液A 1mLは（原生薬約0.42gに相当する。）添加物として、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、ソルビタン脂肪酸エステル、香料、エチルパニリン、パニリン、プロピレングリコール、白糖、L-グルタミン、シリコーン樹脂、グリセリン脂肪酸エステル、CMC-Naを含有する。

かぜのひきはじめ、頭痛に

葛根湯液Ⅱ
かっこんとうえき

クラシエの漢方
 眠くなる成分は入っておりません

1日2回

内服液 45mL×2本（1日分）

第2類医薬品

漢方製剤

かぜのひきはじめ、頭痛に

葛根湯液Ⅱ

クラシエの漢方
 眠くなる成分は入っておりません

1日2回

内服液 45mL

第2類医薬品

18359

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

押して開ける

販売名：**クラシエ葛根湯液Ⅱ**

第2類医薬品

△使用上の注意

■相対すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 (4) 胃腸の弱い人
 (5) 発汗傾向の強い人
 (6) 高齢者
 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 (8) 次の症状のある人
 ① けいれん、排尿困難
 ② 次の診断を受けた人
 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、不眠、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のたるさ、しびれ、つばり感やこむら返りに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のたるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1か月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期服用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
 (4) 使用期限（外箱及びビシラベルに記載）のすぎた商品は服用しないでください。
 (5) ビンをあけたら飲みきってください。
 (6) ビンをあけたまま保存しないでください。

発売元 **薬品株式会社**
クラシエ
 東京都港区海岸3-20-20
 ホームページ www.kracie.co.jp
 お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
 受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **大協薬品工業株式会社**
 富山県富山市水橋島等17-3
 副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931

製造番号
 使用期限

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名：**クラシエ葛根湯液Ⅱ**

第2類医薬品

△使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚寒な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
(4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の強い人
(6) 高齢者
(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
(8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用	症状
アレルギー	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、胃痛、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

製造販売元
クラシエ薬品株式会社
東京都港区海岸 3-20-20
ホームページ www.krasi.co.jp
お電話相談窓口 ☎03(5446)3334
受付時間
10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
大協薬品工業株式会社
富山県富山市水橋島等17-3
副作用被害救済制度の問い合わせ ☎0120-149-931

性状の名称 症状
偽アルドステロン症、ミカバネ 手足のだるさ、しびれ、つぼり感やむくみに加えて、脱力感、低血糖があらわれ、徐々に悪くなる。
肝機能障害 黄や白目が黄色くなる、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振が多くなる。
3. 1ヵ月位(感冒の初期、風かぜ、頭痛に服用する場合には5~6日)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期服用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 湿気の多い場所に入れ替えないでください。
(4) 使用期限(外箱及びビンラベルに記載)のすぎた商品は服用しないでください。
(5) ビンを空けたら飲みきってください。
(6) ビンをおけたまま保存しないでください。

発 売 元
クラシエ薬品株式会社
東京都港区海岸 3-20-20
ホームページ www.krasi.co.jp
お電話相談窓口 ☎03(5446)3334
受付時間
10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
大協薬品工業株式会社
富山県富山市水橋島等17-3
副作用被害救済制度の問い合わせ ☎0120-149-931

〈効 能〉
体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

〈用法・用量〉
成人(15才以上)1回1本、1日2回朝夕、食前又は食間によく振ってから服用する。
15才未満は服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉
(1) 定められた用法・用量を厳守してください。
(2) 生薬抽出液剤のため、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

〈成 分〉
成人1日の服用量90mL(45mL×2本)中
葛根湯抽出液A..... 60mL
カクコン8g、マオウ・タイソウ各4g、ケイヒ・シャクヤク各3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより抽出。
(葛根湯抽出液A 1mLは原生薬約0.42gに相当する。)

添加物として、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、ソルビタン脂肪酸エステル、香料、エチルパラニリン、パニリン、プロピレングリコール、白糖、L-グルタミン、シリコン樹脂、グリセリン脂肪酸エステル、CMC-Naを含有する。

4 987045 183638

A04-U

紙箱
再生紙使用

かぜのひきはじめ、頭痛に

葛根湯液Ⅱ
かっ こん どう えき

クラシエの漢方
眠くなる成分は入っておりません

1日2回

内服液
45mL×4本
(2日分)
第2類医薬品

かぜのひきはじめ、頭痛に
葛根湯液Ⅱ
クラシエの漢方
眠くなる成分は入っておりません
漢方製剤

かぜのひきはじめ、頭痛に
葛根湯液Ⅱ
クラシエの漢方
眠くなる成分は入っておりません
漢方製剤

18363

漢方製剤

かぜのひきはじめ、頭痛に
葛根湯液Ⅱ
クラシエの漢方
眠くなる成分は入っておりません
漢方製剤

かぜのひきはじめ、頭痛に
葛根湯液Ⅱ
クラシエの漢方
眠くなる成分は入っておりません
漢方製剤

18363