

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりと立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)火気には近づけないこと(エタノール含有物)
- キャップをしっかりとしめないと液が漏れることがある
- プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座等)、化織の衣類、木材(塗料塗り家具、床等)、皮革等に液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

\あつらいいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒544-0045 大阪市中央区道修町4-40

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

税控除対象

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

アンメルツ レディーナ

販売名:アンメルツ レディーナ

External Anti-Inflammatory / Analgesic

第3類医薬品 外用鎮痛消炎剤

特徴

1 有効成分の働きで、つらい肩こり、筋肉痛をしっかりと和らげます

2 オレンジシトラスのほのかな香りで、ニオイを気にせず安心して使えます

3 手が汚れず使いやすいヨコヨコボトル

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜等(2)湿疹、かぶれ、傷口

☒ 相談すること

1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 脳	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、打撲、捻挫、関節痛

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること

(2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること

(3) 外用のみを使用すること
● 塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと

● 皮ふの特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないこと

● ヒリヒリとした刺激が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

成分・分量 100mL中

サリチル酸ブリコール 2500mg
l-メントール 3000mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩 100mg
トコフェロール酢酸エチル 100mg

添加物として、プロピレンジコール、ジプロピレンジコール、エタノール、香料を含有する

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

MADE IN JAPAN