

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください

※キャップを取り、容器の先端のノズルを患部に軽く押し当てて塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

(1)定められた用法・用量をお守りください。

(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

(5)外用のみの使用してください。

(6)本剤のついた手で目や粘膜にふれないでください。

火気厳禁・第二石油類  
危険等級Ⅲ(エタノール)

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

RAKOO

30mL

# 7つの有効成分配合 水虫治療

液

## 殺真菌 (テルビナフィン塩酸塩)

1日1回で効く



ナード

水虫プラスHT7液

第2類医薬品

水虫・たむし  
治療薬

【成分・分量】1g中

テルビナフィン塩酸塩…10mg

リドカイン…20mg

ジフェニヒドラミン塩酸塩…5mg

グリチルレチン酸…5mg

イソプロピロメチルフェノール…3mg

クロタミトン…50mg

α-メントール…20mg

添付物: エタノール、1,3-ブチレン

グリコール、ヒドロキシプロピル

セルロース、pH調節剤、その他

1成分

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。

(4)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

(5)火気には近づけないでください。

(6)使用済み容器を火中に投じないでください。

(7)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化織の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。

発売元

ラクール薬品販売株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆  
フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元

東光薬品工業株式会社  
東京都足立区新田2丁目16番23号

ここから  
開けてください

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください

本剤または本前の成分によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤・かゆみ・はれ等)を起したことがある人。

2.次の部位には使用しないでください

(1)目や目の周囲、粘膜(例えば口腔・鼻腔、瞼等)、陰のう、陰部等。(2)湿疹。(3)湿潤、ただれ、電撃や外傷のひどい部位。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊娠または妊娠している可能性のある人。(3)乳幼児。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)薬疹が範囲または広範囲の人。(6)患部が化膿している人。(7)湿疹(かみすじか・いんきんたむし)にかゆみ・たむきがはつきりしない人。

(8)うにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

開梱部位

症 状

かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑、落屑(フケやアカのように皮が剥がれる)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮の亜裂、痛み、色素沈着、発疹、発赤、かゆみ、はれ、じんましん。

\*全身に発現することがあります。

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合は、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください