

第3類医薬品

特納用

のどの痛み のどのあれに

プレコール®のどスプレー

口腔咽喉薬

プレコールのどスプレーの特徴

1. 有効成分ポビドンヨードがのどのあれ、のどの痛み、声がれにすぐれた効果を発揮します。
2. チェリーの香りで、のどをスツキリさわやかにします。
3. 携帯に便利なオーバーキャップ式の容器です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (2) 授乳中の人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人
□内のひどいただれ
 - (5) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

使用法

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) のどの粘膜面にのみ使用して下さい。
- (4) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。
- (5) 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入るおそれがありますので、ノズルをのどの粘膜面に向けて、ア〜ッと声を出しながら、適量を噴射塗布して下さい。



- 最初は液が出るまで4〜5回押して下さい。
- 使用後は清潔なティッシュペーパー等で拭いてキャップを閉めて下さい。

成分・分量

本剤は、赤褐色の液剤で、1mL中に次の成分を含有しています。

ポビドンヨード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4.5mg

添加物：ヨウ化K、グリセリン、メントール、エタノール、香料、プロピレングリコール

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4) 衣服に付着した時は、水で洗い流して下さい。
- (5) 火気に近づけないで下さい。
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 03(5205)8331
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo

東京都中央区日本橋3-14-10

AD