

第3類医薬品

特納用

目のかわき・疲れ・かすみに

ティアリッチ目薬


涙液タイプの目薬

ティアリッチ目薬の特徴

1. 涙液タイプの目薬で、目のかわき、目の疲れ、目のかすみに効果をあらわします。
2. コンタクトレンズを装着したまま点眼できます。



コンタクトレンズを装着
したまま点眼できます



目のかわき

! 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

使用法

1回2～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (3)点眼用にのみ使用して下さい。

成分・分量

本剤は、無色澄明の液で、100mL中に次の成分を含有しています。

塩化ナトリウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550mg

塩化カリウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150mg

添加物：ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、ポリソルベート80、クロロヘキシジングルコン酸塩液、ヒドロキシエチルセルロース

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。
- (6)自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないで下さい。(容器が変形することがあります)

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

日東メディック株式会社
富山県富山市八尾町保内1-14-1