

# アキロン<sup>®</sup>s

## 特納用40mL

第3類医薬品

開封口

### 〈使用方法〉

1日数回、患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。

〈使用方法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用すること。  
〈成分・分量〉 100mL中  
ペンゼトニウム塩化物……………0.1g  
アラントイン……………0.2g  
クロロフェニランミンマレイン酸塩…0.2g  
添加物:エタノール、塩化Na、pH調節剤、香料、チモール、L-メントール  
(保管及び取扱以上の注意)  
(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5) 持ち運びの際は、キャップが押され液が漏れることがありますので、密封できる袋等に入れて下さい。

〈お問い合わせ先〉

第一三共ヘルスケア株式会社

お客様相談室

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

①登録商標

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

### △ 使用上の注意

#### ※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人  
(3) 患部が広範囲の人  
(4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

使用期限

製造番号

### 特納用

## キズの殺菌消毒に

# アキロン<sup>®</sup>s

## 皮膚の修復成分配合

第3類医薬品

### 〈効能・効果〉

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

### 殺菌消毒薬

### 外用専用/40mL

## 第一三共ヘルスケア

### 〔容器の開け方〕



キャップがきつい場合には、ちょうつがいを親指で押して下さい。開けやすくなります。

### 〔容器の使い方〕

#### スプレー式

口を下にしてボディを瞬間的に強く押すと薬が霧状に出ます。すり傷、かき傷に。



#### 洗浄式

口を下にしてボディを軽く押すと、そのまま薬液が流れます。汚れた傷口の消毒に。



#### 脱脂綿に浸して

洗浄式の要領で、脱脂綿又はガーゼに浸して用います。目の上の傷や痔疾時の肛門の消毒等に。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



4 987774 065533