

インドメタシン配合 経皮吸収型消炎鎮痛剤

第2類医薬品

タナベインドメタシンシップ



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください。
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。
- 次の部位には使用しないでください。
 - 目の周囲、粘膜等。
 - 湿疹、かぶれ、傷口。
 - 水虫・たむし等又は化膿している患部。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効 能

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状を緩和する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
2. 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 11歳未満の小児に使用させないでください。
4. 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
5. 連続して2週間以上使用しないでください。

成分（膏体 100g中）

インドメタシン 0.375g

添加物：ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ヒマシ油、ゼラチン、カオリン、
ℓ-メントール、エデト酸Na、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリ
アクリル酸、カルボキシビニルポリマー、D-ソルビトール、酸化チタン、マ
クロゴール、pH調整剤、その他1成分

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18

製造販売元
株式会社大石膏盛堂
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

本品のお問い合わせは、下記にお願いいたします。
田辺三菱製薬「くすり相談センター」
(フリーダイヤル ☎ 0120-54-7080)
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30

副作用被害救済制度の問合せ先 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
(独)医薬品医療機器総合機構 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

4-JLX

本品には添付文書はついておりません。
直接容器(アルミ袋)の記載内容です。