

第2類医薬品

タナール AIクリーム

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

かサつく肌のかゆみに

タナール AIクリーム

鎮痒消炎薬

有効成分
かゆみ止め
抗炎症

湿潤成分
配合

・ジフェンヒドラミン
・クロタミトン
・リドカイン
・グリチルレチン酸
・トコフェロール酢酸エステル

ヒアルロン酸 Na
配合でしっとり!

皮膚炎やかサつく肌の

かゆみ ストッポ!

容量100g

かゆみ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、虫さされ、湿疹、ただれ、あせも、しもやけ

製造番号
使用期限

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるようにこの紙箱を大切に保管してください。

使用上の注意

※ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください
(1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
(2) 傷のあるところ

※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 潤滑やたれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この紙箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この紙箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。



発売元
白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町 515
<http://www.shirogane.info/>

お客様相談室 TEL: 0744-21-5588
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町 515

紙箱 MADE IN JAPAN



2013年3月改訂 第2版
タナール AI クリーム 白金

第2類医薬品

かサつく肌のかゆみに

タナール AIクリーム

鎮痒消炎薬

有効成分
かゆみ止め
抗炎症

湿潤成分
配合

・ジフェンヒドラミン
・クロタミトン
・リドカイン
・グリチルレチン酸
・トコフェロール酢酸エステル

ヒアルロン酸 Na
配合でしっとり!

かゆみ ストッポ!

ワンタッチキャップ

かゆみ、かぶれ、しっしんに

容量100g

かゆみ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、虫さされ、湿疹、ただれ、あせも、しもやけ

無香料

鎮痒消炎薬

タナール AIクリーム

【販売名】タナール AIクリーム
【効能・効果】かゆみ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、虫さされ、湿疹、ただれ、あせも、しもやけ

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 100g中

ジフェンヒドラミン・・・1.0g
クロタミトン・・・5.0g
リドカイン・・・2.0g
グリチルレチン酸・・・0.2g
トコフェロール酢酸エステル・・・0.5g
添加物として、ステアリルアルコール、ステアリン酸、1,3-ブチレンジオール、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、エデト酸Na、pH調整剤、l-メントール

ステロイド成分を配合していません

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく早くご使用ください。
- (5) 使用後はキャップをしっかりと締めてください。



4 935583 204278

第2類医薬品