

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

乗りもの酔いに/酔ってからでも効く

# センバア S

第2類医薬品

〈乗物酔い薬〉

◆センバア Sは、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の症状を予防・緩和し、旅行や遠出を快適で楽しいものにするための薬です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと




(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
- 2 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります)



## 相談すること



- 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 次の症状のある人。  
排尿困難  
(5) 次の診断を受けた人。  
緑内障
- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
泌尿器	排尿困難

- 3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
□のかわき、眠気

## 効能

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和



めまい



吐き気



頭痛


## 用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。  
乗物酔いの予防には乗車船の30分前に1回  
1錠を服用します。なお、必要に応じて追加  
服用する場合には、1回1錠を4時間以上の  
間隔をおき服用してください。

### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)錠剤の取り出し方  
図のように錠剤の入っている  
PTPシートの凸部を指先で強く  
押し、裏面のアルミ箔を破り、取  
り出して服用してください。(誤っ  
てそのまま飲み込んだりすると食  
道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故  
につながります)



年 令	1回量	服用回数
15才以上	1錠 	1日2回まで
15才未満	服用しないこと	

## 成 分

1錠中

成 分	分 量	はたらき
塩酸メクリジン	25mg	嘔吐中枢への刺激伝達を遮断し、めまい・吐き気をおさえます。

添加物：D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、香料、デキストリン、乳糖、黄色5号

## 保管及び取扱い上の注意


- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が  
変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



## 乗物酔いをさけるために、次の点にもご注意ください



前夜は十分  
な睡眠を  
心がけま  
しょう。



気分よく  
すごしやすい、前方の  
席や窓際の  
席を選びま  
しょう。



飲みすぎや  
食べすぎは  
さげましょ  
う。



適度なおしゃ  
べりで気分  
よくすごしま  
しょう。

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)