

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



せき・たんに
〈非麻薬性〉鎮咳成分・ジメモルファンリン酸塩配合

新パブロンせき止め液

第2類医薬品

〈せき止め薬〉

- ◆新パブロンせき止め液は、〈非麻薬性〉の鎮咳成分・ジメモルファンリン酸塩を配合したせき止め薬です。
- ◆2つの基準外成分(ジメモルファンリン酸塩、プロムヘキシン塩酸塩)をはじめ、5つの成分が協力し合って、せき、たんの症状を効果的に改善します。
- ◆コーヒー風味の服用しやすいシロップ剤で、大人(15才以上)専用のせき止め薬です。
- ◆本製品は、麻薬成分を含んでいません。



使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- ① 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります)



相談すること



- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(5) 次の診断を受けた人。
糖尿病、緑内障
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛、頭重、めまい
循環器	動悸、頻脈
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、脱力感、倦怠感

まれに右記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、下痢、眠気
- ④ 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください


効能

せき、たん



用法・用量

1日3回毎食後、及び必要な場合には就寝前を加えて
1日4回まで服用することができます。

年齢	1回量	服用回数
15才以上	10mL 	1日3回
15才未満	服用しないこと	

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)キャップを閉める前にびんの口についた液を清潔なガーゼ等でふいてください。(液が固まってキャップが開けにくくなる場合があります)

成分

40mL中

成分	分量	はたらき
ジメボルファンリン酸塩	60mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。
ブロムヘキシン塩酸塩	8mg	せきの原因となるたんを出しやすくします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	抗ヒスタミン作用により、せきをしずめます。
リゾチーム塩酸塩	40mg(力価)	のどにからんだたんをやわらかくして、出しやすくします。
無水カフェイン	80mg	中枢に作用して他の成分のはたらきを助けます。

添加物：D-ソルビトール、キシリトール、トレハロース、ステビアエキス、スクラロース、パラベン、安息香酸、クエン酸Na、クエン酸、香料、バニリン、メントール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
なお、冷蔵庫で保管した場合、まれに成分の一部が結晶化することがあります。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



せき、たんを早く治すため、次の点にもご注意ください

喫煙はさげましょう。



室内の空気の乾燥やホコリ
等に気をつけましょう。



冷たい空気に当たらない
ようにしましょう。



栄養・睡眠を十分にとり、
体力の消耗を防ぎましょう。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

- 連絡先** 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)