

2012年11月  
(記載要領変更に伴う改訂)

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 芳香性健胃消化薬 **太田胃散**

**⚠ 使用上の注意**

- ⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1. 透析療法を受けている人は服用しないでください 2. 長期連用しないでください
- ⚠ 相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人。 2. 服用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**■効能・効果** 飲みすぎ、胸やけ、

胃部不快感、胃弱、胃もたれ、食べすぎ、胃痛、  
消化不良、消化促進、食欲不振、胃酸過多、胃  
部・腹部膨満感、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔  
のむかつき、悪心)、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、胃重 **■用法・**

**用量** 成人(15歳以上)1回1.3g、8~14歳 1回0.65g、  
1日3回食後又は食間に服用してください。(添付のさじはすり  
切り1杯で約1.3gです。中ぶた裏のすり切り板をご使用くださ  
い。食間とは食後2~3時間のことをいいます。) **<用法・用量に**

**関連する注意>**小児に服用させる場合には、保護者の指導監  
督のもとに服用させてください。 **■成分** (1.3g中) ケイヒ92mg、

ウイキョウ24mg、ニクズク20mg、チョウジ12mg、チンピ22mg、  
ゲンチアナ15mg、ニガキ末15mg、炭酸水素ナトリウム625mg、  
沈降炭酸カルシウム133mg、炭酸マグネシウム26mg、合成ケイ  
酸アルミニウム273.4mg、ビオチン40mg [添加  
物] l-メントール **■保管及び取扱い上の注意** (1) 直射日光

の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

<製品のお問い合わせ先>お客様相談室 ☎ (03) 3944-1311

受付時間 9:30~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社 太田胃散

東京都文京区千石2-3-2