

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

タナベ ポピクル

のど
スプレー

販売名 ポピクル 第3類医薬品

30mL ノンガスタイプ **メントール味**

口腔内殺菌消毒剤

『タナベポピクル』は、噴射することで薬剤がのどの患部に直接届き、のどを殺菌し、のどの痛みやはれ、声がれなどの不快症状を緩和します。



使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(2) 授乳中の人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 次の症状のある人。 口内のひどいただれ

(5) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

のどの炎症によるのどあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

用法・用量

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) のどの塗布用のみ使用してください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入るおそれがありますので、ノズルののどの患部に向けて、アーツと声を出しながら、2～3回直射してください。
- (5) 用法・用量をお守りください。

30mL中

成分・分量

成分	含量	はたらき
日局ホピドンヨード	135mg	のどを殺菌消毒します

添加物：グリセリン、プロピレングリコール、エタノール、ヨウ化カリウム、*l*-メントール

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 衣服などに付着した場合、水か洗剤でなるべく早く洗い落としてください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。
- (7) 冬季など気温の低い時に、薬液の粘度が高くなり、噴射しにくくなる場合がありますので、手の中で少し温めてからお使いください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

使
い
方

① オーバーキャップを取りはずします。



② のどの患部にノズルを向けて、アーツと声を出しながら直射します。



③ 使用後は、キャップが「パチン」となるまで閉めてください。



※最初にお使いになる時は、液が出るまで4～5回程空押しをしてください。

販売元

田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18

製造販売元

共立薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1085番地

本品のお問い合わせは下記にお願いいたします。

田辺三菱製薬「くすり相談センター」
(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)

受付時間：弊社営業日の9:00～17:30

副作用被害救済制度の問合せ先 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
(独)医薬品医療機器総合機構 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)