

2012年6月改訂

(記載要領変更に伴う改訂)

第2類医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

胃腸薬

日本薬剤熊膽圓

和漢薬製剤

日本薬剤熊膽圓は、健胃作用や整腸作用のある生薬を成分とした和漢薬製剤であり、便秘、胃弱、二日酔・悪酔のむかつきなどの症状に優れた効果を発揮する胃腸薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(3)胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、整腸（便通を整える）、軟便、便秘

裏面もよくお読みください。




【用法・用量】

次の量を食間に、水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1個 	3回
11歳以上15歳未満	2/3個 	3回
11歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)日本薬剤熊膽圓の取り出し方
右図のように日本薬剤熊膽圓の入っているアルミ箔（バイナライト）を指先で裂き、取り出してください。


**【成分・分量】**

1日量（3個）中 （1包：1個入）

オウレンエキス ……………11.2mg（原生薬 オウレン ……………70mgに相当）
 オウバクエキス ……………49.4mg（原生薬 オウバク ……………380mgに相当）
 センブリエキス ……………14mg（原生薬 センブリ ……………70mgに相当）
 ゲンチアナエキス ……………62mg（原生薬 ゲンチアナ ……200mgに相当）
 ダイオウエキス ……………40mg（原生薬 ダイオウ ……………200mgに相当）
 ウコンエキス ……………28mg（原生薬 ウコン ……………350mgに相当）
 アロエ ……………150mg
 動物胆（牛胆） ……………50mg
 アカメガシワエキス ……………275mg（原生薬 アカメガシワ ……2500mgに相当）
 添加物として、デキストリン、タルクを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

**〈お問い合わせ先〉**

本剤のご使用により、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

「お客様相談窓口」

電話番号 076-424-2239

（月～金 9:00～17:00（祝日を除く））

製造販売元 **日本薬剤株式会社**

富山市東中野町一丁目1番1号

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）