

かぜの初期症状に

ここからあける

△使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の強い人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
 - むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

またに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばひ感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〈効能・効果〉かぜの初期症状(発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり)

〈用法・用量〉成人(15才以上)1回1本、1日3回食間によく振ってから服用する。(1)用法・用量を厳守すること。(2)小児には服用させないこと。

〈成分・分量〉

1日量90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス	8.3g
カッコン	8g
マオウ	4g
タイソウ	4g
ケイヒ	3g
シャクヤク	3g
カンゾウ	2g
ショウキョウ	1g
より得た軟エキス	

添加物としてブドウ糖、果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料を含有。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になりたり品質が変わる)
- (4) 生薬成分を配合しているため、まれに沈殿が生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

販売名 カッコン 第2類医薬品

萬金薬品工業株式会社
奈良県高市郡明日香村野口317

お客様相談室 TEL:0744-54-2012
AM8:30～PM5:00 土、日、祝日を除く

副作用被害救済制度の問合せ先
電話:0120-149-931



30mL×3本 1日分



30mL×3本 1日分

眠くなる成分は入っておりません

内服液

水 鼻づまり
熱 鼻・首筋のこわばり
頭痛 さむけ
発熱 頭の痛み

葛根湯

かっ こん とう

内服液

30mL×3本 1日分

発熱、頭痛、さむけ、のどの痛み、
鼻水、鼻づまり、肩・首筋のこわばり

かぜの初期の諸症状に
葛根湯

第2類医薬品



4 982178 336630

使用期限

製造番号

¥1,350+税

紙 箱:ガラス:瓶
金 属:キャップ

水 鼻づまり
熱 鼻・首筋のこわばり
頭痛 さむけ
発熱 頭の痛み

葛根湯

かっ こん とう

内服液

30mL×3本 1日分