

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

口腔咽喉薬

第3類医薬品

のどの痛み・はれ、声がれに

特納用

# 新ルルエースのどスプレー

## 新ルルエースのどスプレーの特徴

1. 有効成分ポピドンヨードがのどの痛み・はれ、声がれにすぐれた効果を発揮します。
2. チェリーの香りで、のどをスッキリさわやかにします。
3. 携帯に便利なオーバーキャップ式の容器です。

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 長期連用しないで下さい。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (2) 授乳中の人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 次の症状のある人  
□内のひどいだけ
  - (5) 次の診断を受けた人  
甲状腺機能障害
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## ■ 効能・効果

のどの炎症によるのどのいたみ・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ

## ■ 使用法

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1)使用法を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)のどの粘膜面にのみ使用して下さい。
- (4)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。
- (5)息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入るおそれがありますので、ノズルをのどの粘膜面に向けて、ア〜ッと声を出しながら、適量を噴射塗布して下さい。



- 最初は液が出るまで4〜5回押しして下さい。
- 使用後は清潔なティッシュペーパー等で拭いてキャップを閉めて下さい。

## ■ 成分・分量

本剤は、赤褐色の液剤で、1mL中に次の成分を含有しています。

ポビドンヨード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4.5mg

添加物：ヨウ化K、グリセリン、メントール、エタノール、香料、プロピレングリコール

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- (4)衣服に付着した時は、水で洗い流して下さい。
- (5)火気に近づけないで下さい。
- (6)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

01®登録商標



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10