

sato

第2類医薬品

筋肉・関節の痛みに

サロメチール®
ID1%スプレー

インドメタシン1%配合

クール感
浸透!肩こり
に伴う肩の痛み

腰痛

関節痛

130mL

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。

鎮痛消炎薬 130mL

第2類医薬品

サロメチールID1%スプレー

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)11才未満の小児。

2.次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむしのような毒又は化粧品している患部。

3.長期適用しないてください

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性ありますので、直ちに使用を中止し、この本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

■効能 筋肉痛、打撲、捻挫、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み

■用法・用量 ●1日4回を限度として適量を患部にこすり塗布します。●11才未満の小児には使用できません。

●用法・用量に関する注意

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)11才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(4)顔に向けて噴霧しないでください。(5)肩、頸部に使用する場合は直接噴霧せず、手に取って塗り塗布してください。(6)大量・広範囲には使用しないでください。(7)外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入にためると、ひどい吐き気等の症状を起すことがありますので、できる限り吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して使用してください。(8)容器をよく振り、真下より10cmの距離で噴霧してください。(9)同じ箇所を連続して3秒以上噴霧しないでください。(10)1週間あたり原液として50g(9日間で本品1本)を超えて使用しないでください。

■成分・分量 130mL中

インドメタシン…607mg(原液1g中 10mg)
 フェンチール…1.821mg(原液1g中 30mg)
 添加剤として、クロロミド、ベンジルアルコール、1,3-ブチレンジオキソール、フェニチール、DMEを含有します。

●保存及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になり品質が変わるおそれがあります)。(4)本剤が衣類や家具、床、皮革製品、化粧品等に付着しないようご注意ください。衣類は変色する可能性があります。(5)火気に近づかないでください。(6)捨てるときは、火気の無い屋外で噴射音が消えるまでポンプを押し、ガスを抜いてください。(7)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

(11)1週間あたり原液として50g(9日間で本品1本)を超えて使用しないでください。

お問い合わせ電話番号 03(5412)7993

金属：缶 キャップ：PP
 外装フィルム：PP

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：DME

発売石油類(インプロピルアルコール)72mL 危険等級Ⅱ 水溶性(火気注意)

第一売元 製造販売元

製造番号及び使用期限は底面に記載

佐藤製薬株式会社

東光薬品工業株式会社

副作用救済制度

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

東京都足立区新田2丁目1番23号

☎0120-149-931

E ML