

保管および取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところ(冷暗所)にキャップをしっかりとめて立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)
 - キャップをしっかりとめないと液が漏れることがある
 - プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座など)、化繊の衣類、木材(塗料塗り家具、床など)、皮革などに液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎ 0120-5884-01
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

紙 : 箱 ラベル : ボトルキャップ



使用に際して、この説明書を必ずお読みください
また必要に応じて読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を
過ぎた製品は使用しないこと

アンメルツレディーナ

販売名: アンメルツ レディーナ **第3類医薬品**
(External Anti-Inflammatory / Analgesic) **外用消炎鎮痛剤**

特徴

- 1 有効成分の働きで、つらい肩こり、筋肉痛をしっかり和らげます**
- 2 オレンジシトラスのほのかな香りで、ニオイを気にせず安心して使えます**
- 3 手が汚れず使いやすいヨコヨコボトル**

使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1 次の部位には使用しないこと**
(1) 目の周囲、粘膜など
(2) 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

- 1 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること**
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること**

| 関係部位 | 症状 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

- 3 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること**

MADE IN JAPAN

効能・効果

肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、打撲、捻挫、関節痛

用法・用量

1日数回患部に適量を塗布してください
＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
 - 塗布部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないこと
 - 皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて使用しないこと
 - ヒリヒリとした刺激が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

成分・分量 100mL中

| 成分 | 分量 | はたらき |
|-----------------|--------|----------------|
| サリチル酸グリコール | 2500mg | 炎症を抑え痛みをやわらげる |
| l-メントール | 3000mg | 清涼感を与え痛みをやわらげる |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 100mg | 炎症を抑える |
| トコフェロール酢酸エステル | 100mg | 血行を促進する |

添加物として、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、エタノール、香料を含有する

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931