



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

2011年10月 記載要領変更に伴う改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

花粉、ハウスダストなどによる目のアレルギー症状に **点眼薬**

第2類医薬品

ノアールアレルギークールSH

抗アレルギー剤配合

ノアールアレルギークールSHは…

- クロモグリク酸ナトリウム(抗アレルギー剤)が目のかゆみ・目の充血等のアレルギー症状を引き起こす化学伝達物質(ヒスタミン等)の放出を抑制します。
- 角膜保護成分であるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムが潤いを保持します。
- 添加物としてヒアルロン酸Na(製剤の粘稠剤)、ヒプロメロース(製剤の粘稠剤)を配合しています。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと事故が起こりやすくなります)

点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
 - (6) 次の診断を受けた人。
緑内障
 - (7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
特に次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師にご相談ください。
 - 片方の目だけに症状がある場合。
 - 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合。
 - 視力にも影響がある場合。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 目のかすみが改善されない場合。
 - (2) 2日間使用しても症状がよくなる場合。
- 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和:

目のかゆみ、目の充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コ
ロコロする感じ)

〔用法・用量〕

1回1～2滴、1日4～6回点眼します。





2日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師または薬剤師にご相談く
ださい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶたやまつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは
使用しないでください。
- (4)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用のみ使用してください。
- (6)本剤はとろみのある薬液のため、点眼後、しばらく視野がぼやけることがありま
すのでご注意ください。

〈使用方法〉

●使う前に手をきれいに洗ってください。

			
下まぶたを軽く押し下げ、 真上から1～2滴を点眼し てください。	容器の先端が目やまつ毛に 直接触れないようにしてく ださい。また、使用後も容器 の先端やキャップは清潔に 取り扱ってください。	滴下した後、目を閉じて2～3 回まばたきし、液を目にい きわたらせてください。	使用後はキャップをしっかり と締めてください。

〔成分・分量と働き〕100mL中

成 分	分 量	働 き
クロモグリク酸 ナトリウム	1g	アレルギーの原因となる化学伝達物質の放出 を抑え、目のアレルギー症状を緩和します。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	0.015g	抗ヒスタミン作用により、アレルギーによる目 のかゆみ、充血を抑えます。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	0.2g	角膜を保護し、潤いを保持します。

添加物として、エデト酸Na、等張化剤、ベンザルコニウム塩化物、ステアリン酸ポリ
オキシシル、プロピレングリコール、グリセリン、*dl*-カンフル、*d*-ボルネオール、ヒプロ
メロース、ヒアルロン酸Naを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して
保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっ
ても、開封後は速やかにご使用ください。
- (6)温度40℃以上となる所に置かないでください。車の中(ダッシュボード等)
や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は
下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393

受付時間:9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1-5-27
A12-10

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10