

*2013年9月改訂

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージの裏面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと


ちくのう症 副鼻腔炎 慢性鼻炎 | チクナイン®

販売名:チクナイン

漢方処方 第2類医薬品

製品特徴

- ちくのう症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎を改善する内服薬です
- 9種類の生薬からなる漢方「シンサイセイハイトウ辛夷清肺湯」の働きで、鼻の奥の炎症を鎮めながら、ウミ膿を抑えて呼吸を楽にします
- 1日2回で効く、服用しやすいスティックタイプの顆粒剤です



⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸虚弱で冷え症の人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる
*腸間膜静脈硬化症	*長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満などが繰り返しあらわれる

3. 1ヶ月くらい服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：
鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

用法・用量

次の量を朝夕、食前または食間に水またはお湯で服用してください

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15才以上）	1 包	2 回
7才以上 15才未満	2/3 包	
4才以上 7才未満	1/2 包	
2才以上 4才未満	1/3 包	
2才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守すること

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量

1日量（2包：4.6g）中

辛夷清肺湯エキス粉末・・・2.5g

<原生薬換算量>

シンイ	1.5g	チモ	1.5g	ビヤクゴウ	1.5g
オウゴン	1.5g	サンシシ	0.75g	バクモンドウ	3.0g
セッコウ	3.0g	ショウマ	0.75g	ビワヨウ	0.5g

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、二酸化ケイ素、乳糖を含有する

●本剤は天然物（生薬）を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

保管および取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること

(2) 小児の手の届かないところに保管すること

(3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）

(4) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を折り返して保管すること
また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします