

ROHTO



販売名: ロートジー®b

Refresh Your Eyes.

# スカッと爽快! 瞳リフレッシュ! 瞳、深呼吸するような気持ちよさ

"Wow, what a feeling!" "Strong yet soft, the indescribable sensation is truly long lasting."  
 "The sensation spreads through my brain—I feel wide awake. My eyes are purified and refreshed." — It's "ROHTO Z!". Feel it!

## ◆特長

### ●目の疲れ・充血に効く!

目の動きを活性化し、新陳代謝も促進する成分や充血除去成分を配合。

### ●スポーツ時などに

硫酸亜鉛水和物配合で、紫外線などによる炎症も抑制。

### ●寝不足のときなどの目の充血や疲れに

栄養成分配合。新陳代謝を促進し、目の疲労時の回復力を高めます。

充血除去成分も配合。疲れ目もスカッと爽快クール!

### ●ドライブ時などに

長時間のドライブなど目の疲れを感じたときの瞳のリフレッシュに。

## 清涼感レベル



いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる フリーアングルノズル®



"Z! (ジー)" したい時、簡単にアイケアできて、とっても便利です。

**自由な角度で点眼OK!**

## キャップの開閉方法

容器全体を支えるようにもち、キャップを上にして開閉してください。

容器の中央部分だけを持って開閉すると薬液がとびだしてしまることがあります。



### キャップの開け方

キャップを手前にひねってください。



### キャップの閉め方

カチッと音がするまで押し下げてください。

## 使用上の注意

### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人…緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. この場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

### 効能・効果

目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、結膜充血、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)

### 用法・用量

1回2~3滴、1日5~6回点眼してください。

#### ●用法・用量に関する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
[汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。 容器の先と目やまつ毛がふれるごとのないように
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



### 成分

塩酸テトラヒドロゾリン………0.05% フロルフェニラミンマレイン酸塩…0.03%  
ネオスチグミンメチル硫酸塩………0.003% ビタミンB6……………0.1%  
硫酸亜鉛水和物……………0.05% L-アスパラギン酸カリウム……………1%  
添加物として、ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、d-カンフル、ハッカ油、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒプロメロース、クロロブタノール、pH調節剤を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共有しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



### お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。  
「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

401000202