

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

目薬 スマイルコンタクト クールブラック **第3類医薬品**

スマイルコンタクト クールブラックの特徴

コンタクトで負担がかかる
つらい目の疲れに。

氷点感 が持続!

うるおい+涙の **4** つの働き



1 酸素補給

L-アスパラギン酸
カリウムが
瞳に酸素を補給。

2 角膜保護

角膜保護成分が、
乾燥によるダメージ
から瞳を守ります。

3 栄養補給

涙にも含まれる
アミノ酸を補給。

4 老廃物排出

目やにや、ほこりを
洗い流します。

清涼感レベル



すべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

コンタクトレンズを装着されていない方もご使用いただけます。

防腐剤(塩化ベンザルコニウム、ソルビン酸カリウムなど)を
配合していません。


【ツイストキャップの開閉方法】

キャップ部分をまっすぐ上にして開閉してください。

※容器の中心を押さえたまま開閉すると、薬液が飛び出すことがあります。
容器の側面をもって開閉してください。


① 開け方

キャップを手前
にひねります



② 閉め方

カチッと音が
するまでまっすぐ
押し下げます



必ず裏面もお読みください

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 目のかすみが改善されない場合。
(2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

● 効能

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

● 用法・用量

1日3~6回、1回1~3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)
また、混濁したものは使用しないでください。
- 点眼用のみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

● 成分(100mL中)

有効成分	含量
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(角膜保護成分)	0.25g
タウリン(アミノ酸成分)	0.2g
L-アスパラギン酸カリウム(アミノ酸成分)	0.1g
塩化ナトリウム(ミネラル成分)	0.2g
ポビドン(うるおい成分)	0.25g

*添加物として、トロメタモール、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、プロピレングリコール、*l*-メントール、*d*-カンフルを含む。

● 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

※この目薬は、携帯袋を入れておりません。

■ お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください
ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7