

第2類
医薬品

急な鼻水、くしゃみに

浅田飴

ビエロップQQ

24錠ドロップタイプ
ペパーミント味

ビエロップQQ
4錠×6スティック

第2類
医薬品

鼻炎薬

⚠️ ご使用上の注意

❌ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。] 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)。 3. 長期連用しないでください。

🗨️ 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 高熱、排尿困難のある人 (6) 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧の診断を受けた人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	泌尿器	その他
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気・嘔吐、食欲不振	頭痛	排尿困難	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。□ のかわき、眠気、便秘、目のかすみ 4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■効能・効果 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭痛

■成分・分量(6錠中) クロロフェニラミンマレイン酸塩 12mg フェニレフリン塩酸塩 15mg ベラドンナ総アルカロイド 0.6mg 無水カフェイン 60mg 添加物として還元水アメ、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK、ショ糖脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNa、ポリソルベート80、l-メントール、D-ソルビトール、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、香料含有

■用法・用量 次の量をかみくだくか、又は口中で溶かして服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	2錠 ○○	1日3回
7才以上15才未満	1錠 ○	
7才未満	服用しないこと ❌	

●定められた用法・用量を厳守してください。
●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

副作用救済制度
0120-149-931

この箱はお薬とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 開封後は袋の口を折り返して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

株式会社 浅田飴 ●お問合せ先 お客様相談室
電話 03-3953-4044(ダイヤルイン)
東京都東村山市久米川町 5-29-7 時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)