

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

## 眼科用薬 スマイル40 プレミアム

**10種**の有効成分が効く  
年齢や目の酷使による眼疲労、目のかすみに

### 〈作用〉



角膜の保護  
涙の安定化



栄養補給  
新陳代謝促進



ピント調節  
炎症鎮静  
充血除去

- ① ビタミンA (35,000単位  
スマイル内最大量配合)
- ② コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
- ③ ビタミンE
- ④ ビタミンB<sub>6</sub>
- ⑤ タウリン
- ⑥ L-アスパラギン酸カリウム
- ⑦ ネオスチグミンメチル硫酸塩
- ⑧ クロルフェニラミンマレイン酸塩
- ⑨ イプシロン-アミノカプロン酸
- ⑩ 塩酸テトラヒドロゾリン

防腐剤(塩化ベンザルコニウム、ソルビン酸カリウムなど)を配合していません。

### ⚠ 使用上の注意

#### 👨‍⚕️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み  
(4) 次の診断を受けた人。緑内障
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 目のかすみが改善されない場合。  
(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

必ず裏面もお読みください

## ●効能


- 目の疲れ
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)
- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)
- 結膜充血
- 目のかゆみ
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## ●用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

## ●成分(100mL中)

有効成分	含量	はたらき
レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)	35,000単位	角膜に直接働き、目の機能を活性化するビタミンです。
酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	0.05g	血行を促進して、栄養を目に補給するビタミンです。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	0.03g	新陳代謝を促す作用があるビタミンです。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.05g	うるおいを保ち角膜を保護します。
タウリン(栄養成分)	0.1g	新陳代謝を促す作用があるアミノ酸です。
L-アスパラギン酸カリウム(栄養成分)	0.2g	目に酸素を取り込むアミノ酸です。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005g	目のピント調節機能を改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03g	目のかゆみなどの不快な症状を抑えます。
塩酸テトラヒドロゾリン	0.01g	目の充血を抑えます。
イプシロン-アミノカプロン酸	1.0g	目の炎症を鎮めます。

\* 添加物として、ホウ酸、トロメタモール、エドト酸Na、BHT、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、プロピレングリコール、L-メントール、d-ボルネオール、等張化剤、pH調整剤を含む。

## ●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

### ■お問合せ先

お問い合わせのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

**ライオン株式会社**

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

1AA 0313