

かぜ薬 コン・コール

第②類医薬品

(カプセル製剤)

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください 5. 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかけられている又はその疑いのある小児(15歳未満)。
(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい	消 化 器	吐き気、嘔吐、食欲不振
泌 尿 器	排尿困難	そ の 他	過度の体温低下		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸・意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (Sjögren's-症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけでも息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 口のかわき、眠気、
4. 5~6回服用しても症状がくやまない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔成分・分量〕

1日量6カプセル (1カプセル335mg) 中

成 分	分 量	葛根湯乾燥エキス……670mg
アセトアミノフェン	400mg	{ カッコン……2144mg マオウ……1072mg シャクヤク……804mg タイソウ……1072mg カンゾウ……536mg ケイヒ……804mg ショウキョウ……268mg 原生薬として6700mgに相当する。 }
エテンザミド	400mg	
無水カフェイン	150mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	
チベジジクエン酸塩	45mg	

添加物として、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウム、色素(青色1号、赤色3号、黄色5号)を含有します。

〔効能・効果〕

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

〔用法・用量〕

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人 (15歳以上)	2カプセル	3 回
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満	服用しないでください	


<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部分を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



<お問い合わせ先>

製造販売元 美吉野製薬株式会社

奈良県吉野郡大淀町大岩692
電話 0745-67-0144 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)