



2012年9月 記載要領変更に伴う改訂

第2類 医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

ハイウルソグリーンス

総合胃腸薬

胸やけ、胃もたれ、消化不良など弱っている胃に効く
服用しやすい顆粒タイプの総合胃腸薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

排尿困難

- (6) 次の診断を受けた人。

腎臓病、心臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

口のかわき、便秘、下痢

4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。



【効 能】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、消化促進

【用法・用量】

下記の1回服用量を食前又は食後に服用します。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
11～14才	2/3包	
8～10才	1/2包	
8才未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
 (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量と働き】 3包中(1包1.2g)

成分	分量	働き
ピオチアスターゼ1000	60mg	でんぷんやタンパク質を消化する酵素で、食べすぎ、胃もたれ、消化不良を改善します。
プロザイム	20mg	タンパク質を消化する酵素です。
ウルソデオキシコール酸	20mg	肝臓に働き、胆汁の分泌を促進し(利胆作用)、脂肪の消化を助けます。
銅クロロフィリンナトリウム	45mg	荒れた胃粘膜の修復作用により、はきけ、食欲不振の症状をやわらげます。
カンゾウ末	150mg	
炭酸水素ナトリウム	1,200mg	過剰に分泌された胃酸を中和します。
炭酸マグネシウム	500mg	
ロートエキス3倍散	90mg (ロートエキスとして30mg)	胃酸の分泌を抑え、胃の痛みをやわらげます。
ケイヒ末	320mg	健胃生薬で弱った胃の調子を整えます。
ウイキョウ末	80mg	
ショウキョウ末	50mg	
ウコン末	100mg	
ゲンチアナ末	60mg	
チョウジ末	50mg	

添加物として、カルメロースカルシウム、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、L-メントール、乳糖、パレイショデンプン、デキストリンを含有します。

【成分・分量に関連する注意】

本剤は銅クロロフィリンナトリウムを含有するため、本剤の服用により、一時的に便が緑色になることがあります。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
 電話 03(5412)7393
 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元
佐藤製薬株式会社
 東京都港区元赤坂1丁目5番27号
 製造販売元
テイカ製薬株式会社
 富山県富山市荒川1丁目3番27号