

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

オムニード0.5IDパップ

第2類医薬品

【特 徴】

- オムニード0.5IDパップは、有効成分のインドメタシンが痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める鎮痛・消炎インドメタシンパップ剤です。
- オムニード0.5IDパップは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ひじやひざにもピッタリフィットします。
- オムニード0.5IDパップは、基剤中の水分により、打撲、ねんざ等による熱をもった患部を心地よく冷却します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

表面のライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

- 15歳未満の小児は使用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】 膏体100g(1,000cm²)中

インドメタシン……………0.5g

添加物として、マクロゴール、l-メントール、酸化チタン、エデト酸Na、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、グリセリン、香料、pH調整剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 24枚入[6枚×4袋](1枚サイズ:14cm×10cm)



発売元

テイコクファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元

帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地



4 987373 070235

〈お問い合わせ先〉
本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電 話 (0879) 25-2363
受付時間 9:00～17:00
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

ここを押して
開けてください。