加味根

かみこん

風邪の初期や肩こりに効く漢ア



10 包入 1.333 円 (税別)

第2類医薬品

ように、風邪は様々な「風邪は万病の元」ときています。と見き起こすことも増を引き起こすことも増 **力**にはもちろん肩こりや邪にはもちろん肩こりや邪にはもちろん肩こりやとなります。 とすの で引きている。 普 音及や不 現代社 不社 漢には で、 方製剤 起こ 早 不摂生ではその季語で めす - 摂生で、 が原因がの元 です た効果を発 なななが必然をなあり、こと言う です ばの症状 での症状 生 やの コが 揮筋風薬 状け ŧ 気う

効能・効果

感冒、発熱、悪寒、身体の疼痛、首・肩・項のこり

成分・分量

本品3包(6g)中、下記生薬より製した加味根乾燥エキス1.65gを含有します。

カッコン・・・3.33g マオウ・・・・2.00g ショウキョウ・・・1.33g タイソウ・・・1.33a シャクヤク・・・1.330

カンゾウ・・・・1.33g ケイヒ・・・・1.33g サイシン・・・・0.67g ソヨウ・・・・0.67g

添加物として乳糖水和物及びバレイショデンプンを含有します。



ケイヒ









ショウキョ

使用上の注意

相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 体の最弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。

- (4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。

- (5) 第六十頃川ッションマック
 (6) 高齢者。
 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 (8) 次の症状のある人。
 (9) 次の診断を受けた人。
 (9) 次の診断を受けた人。 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、

-	の又書を持つ(医師、楽剤師乂は登録販売者に相談すること				
	関係部位	症	状		
	皮 膚	発疹・発赤、かゆみ			
	消 化 哭	叶き気 食欲不振	胃部不快感		

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

•	(1tic):此の里馬な症状が起とるととがめる。(の物目は巨りに広門の砂原を支げる					
ı	症状の名称	症	状]		
	偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しび 脱力感、筋肉痛があ	h、つっぱり感やこわばりに加えて らわれ、徐々に強くなる。			

- 3. 1ヵ月位(感冒、発熱、悪寒に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない 場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用

年 齢	1 回量	1日服用回数
成 人	1 包 (2g)	3 🗓
15歳未満	服用しないこと	

食間とは…食後2~3時間を指します。

<保管及び取り扱い上の注意>

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。) (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

成分・分量に関する注意

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品 の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品 質には変わりありません。



