

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

かゆみ 肩こりに
キンカン[®]
外用鎮痒鎮痛消炎剤

第2類医薬品

■ 製品の特徴 ■

キンカンは有効成分が複合的に作用して、すばやく患部の熱を奪い去り、局所刺激を与えることにより、かゆみや痛みの伝わりを抑制し、虫さされ、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻挫に対して優れた効果を発揮します。



■ 使用上の注意 ■

⊗ してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) かぶれ、傷口
2. かぶれる恐れがあるので、ガーゼ等に浸して患部に貼り付けしないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
 - (4) 皮膚の特に弱い人や乳幼児
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ただれ、灼熱感

3. 本品を5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能又は効果 ■

虫さされ、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻挫

■ 用法及び用量 ■

1日数回、患部に適量を塗布してください。



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。誤って口に入った場合には、水でうがいをしてください。飲み込んでしまった場合には、医師に相談してください。

(裏面もお読みください)

◆使用方法

- ①ご使用前に瓶を上向きにし、スポンジ中央を数回押してください。
中の空気が抜け、液の出過ぎを防ぐことができます。(図1)
 - ②患部を清潔な状態(汚れ・化粧品・薬剤等が付着していない状態)にしてください。
 - ③スポンジを患部に軽く押しつけ、液をふくませます。(図2)
 - ④「塗ってはよく乾かし」を複数回繰り返してください。
- ※かぶれる恐れがありますので、完全に液が乾くまでは衣服・ガーゼ等で覆わないようにしてください。
- ※目詰まりすることがあるため、スポンジが汚れたらやさしく拭き取ってください。



■成分及び分量■ (100mL中)

成分	含量
アンモニア水	21.3mL
<i>l</i> -メントール	1.97g
<i>d</i> -カンフル	2.41g
サリチル酸	0.57g
トウガラシチンキ	0.35mL (原生薬量として35mg)

添加物として朝鮮人参抽出液、溶剤としてアルコールを含有します。

■保管及び取扱い上の注意■

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)溶剤としてアルコールを含んでいるため、下記事項に充分注意してください。
 - 暖房器具等の火気の付近では、破裂、引火等の危険性があるので、近づけないでください。
 - 車の中は、高温になりやすいので、放置しないでください。
 - プラスチック類、化繊製品、皮革製品、家具、床、その他塗装箇所に液が付着すると、変色・変質することがあります。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6)開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

■消費者相談窓口■

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社 金冠堂 お客様相談室 TEL:03-3421-6171

[受付時間:9:00~16:00 月~金(祝日を除く)]

製造販売元 株式会社 金冠堂
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-34-14
<http://www.kinkan.co.jp>

販売名

キンカン[®]

外用鎮痒鎮痛消炎剤

第2類医薬品



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

▲ ■使用上の注意■

⊗してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) かぶれ、傷口
2. かぶれる恐れがあるので、ガーゼ等に浸して患部に貼り付けないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人 (4) 皮膚の特に弱い人や乳幼児
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ただれ、灼熱感

3. 本品を5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能又は効果■

虫さされ、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻挫

■用法及び用量■ 1日数回、患部に適量を塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用してください。誤って口に入った場合には、水でうがいをしてください。飲み込んでしまった場合には、医師に相談してください。

◆使用方法

- スポンジを患部に軽く押しつけ、液をふくませてから塗ってください。
- 「塗ってはよく乾かし」を複数回繰り返してください。

■成分及び分量■ (100mL中)

アンモニア水 21.3mL、*l*-メントール 1.97g、*d*-カンフル 2.41g、サリチル酸 0.57g、トウガラシチンキ 0.35mL(原生薬量として35mg)

添加物として朝鮮人参抽出液、溶剤としてアルコールを含有します。

■保管及び取扱い上の注意■

(1) 小児の手の届かない所に保管してください。(2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(3) 溶剤としてアルコールを含んでいるため、下記事項に充分注意してください。●暖房器具等の火気の付近では、破裂、引火等の危険性があるので、近づけないでください。●車の中は、高温になりやすいので、放置しないでください。●プラスチック類、化繊製品、皮革製品、家具、床、その他塗装箇所に液が付着すると、変色・変質することがあります。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(6) 開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

瓶は常に立てて置いてください。

■消費者相談窓口■

TEL:03-3421-6171 [9:00～16:00 月～金(祝日を除く)]

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
TEL 0120-149-931(フリーダイヤル)

火気厳禁
第二石油類

製造販売元 株式会社 金冠堂

〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-34-14

http://www.kinkan.co.jp



台紙



キャップ:PP
中栓:PE
リスター:PE

ガラス:瓶



987062404761