

外用鎮痛消炎薬(貼付剤) 第2類医薬品

# バンテリン<sup>ニュー</sup>新ミニパット

## ▲ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください  
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 長期連用しないでください

### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 成分・分量(膏体100g中)

成分・分量	働 き
インドメタシン1.0g	非ステロイド性の鎮痛消炎成分で、筋肉や関節の痛みをとりず。

[添加物] クロタミトン、L-メントール、ポリアクリル酸部分中和物、カルメロースNa、エステルガム、グリセリン、D-ソルビトール、カオリン、亜硫酸水素Na、エデト酸Na、セラチン、チモール、パルミチン酸デキストリン、流動パラフィン、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、乳酸

●本製品は、1枚当たり35mgのインドメタシンを含んでいます。

製造番号

使用期限

この外箱は本剤とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。

## 効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫


## 用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を守ってください。(2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(5) 連続して2週間以上使用しないでください。

### 上手な貼り方



まず、①のフィルムをゆっくりはがし、患部に貼ります。

次に、②のフィルムをはがしながら貼ります。

開け口

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わります。)(4) 品質保持のため、開封後の未使用分は薬袋に入れ、開口部のチャックをきちんと密閉し、保管してください。(5) 使用期限(外箱及び薬袋に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 興和株式会社 お客様相談センター  
TEL 03-3279-7755 月～金(祝日を除く)9:00～17:00

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931



**Kowa** 製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
製 造 前田薬品工業株式会社 富山市向新庄町一丁目18-47

