

かゆみ・
虫さされ用薬

新ウナクール


●つめたいかゆみ止め! ●かゆみをダブル作用で止める!

新ウナクールは、かゆみが気持ち良くひいていく、つめたいかゆみ止めです。本剤を塗りますと、かゆくてほてっている患部がまずつめた〜くなります。

このクールな冷却感に続いて、有効成分のリドカインとジフェンヒドラミン塩酸塩のダブル作用により、かゆみを早く止めます。

しかも、患部にムラなく塗布できるように改良した使用感の良いスポンジを採用しています。蚊やダニなどの虫にさされた時は、まずこの新ウナクールをお使いください。

リドカインが、かゆみの伝わりを止めます。



(イメージ図)

ジフェンヒドラミン塩酸塩が、かゆみのもとになるヒスタミンの働きをおさえます。

⚠ 使用上の注意**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1) 創傷面。
- (2) 目や目の周囲、粘膜等。

🗨 相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
- ② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

- ③ 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量 (1mL中)

| 成分・分量 | 働 き |
|---------------------|----------------------------------|
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 20.0mg | かゆみのもとになるヒスタミンの働きをおさえ、かゆみをしずめます。 |
| リドカイン 5.0mg | かゆみの伝わりを止め、かゆみを感じなくします。 |
| l-メントール 30.0mg | 患部に清涼感を与え、かゆみをやわらげます。 |
| dl-カンフル 20.0mg | |

〔添加物〕エデト酸Na、クエン酸、ゲラニオール、エタノール

効能・効果

かゆみ、虫さされ

(裏面へ続く)




用法・用量

1日数回適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>

- ① 用法・用量を守ってください。
- ② 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ③ 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ④ 外用にのみ使用してください。
- ⑤ 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮膚を密着（正座等）させないでください。

●容器の使い方

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| 1.まずキャップをはずして、図のように容器を逆さに持ってください。 | 2.ムラなく塗れるようスポンジ面を軽く患部に押しつけ、液を十分に浸透させて塗布してください。 | 3.使用後は必ずキャップをしっかりとめてください。 |

※使用感がよく、破れにくいスポンジ素材を使用していますが、液がスポンジ面に充分浸透していないと、スポンジ面が破れるおそれがありますので、注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- ① 高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④ 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- ⑤ 容器が変形するおそれがありますので、車の中など、高温になる場所に放置しないでください。容器の変形により、スポンジ部分の脱落や、液もれがおこるおそれがありますので注意してください。
- ⑥ 本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。
- ⑦ メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- ⑧ 火気に近づけないでください。
- ⑨ 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755

FAX 03-3279-7566

受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

●興和製品サイト <http://hc.kowa.co.jp/otc>



製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

Languages

English

简体字

繁體字

한국어

<http://hc.kowa.co.jp/otc/tenpu>

