

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

特納用

アレルギー性鼻炎・急性鼻炎の症状に

そらう[®] 爽AL点鼻薬

爽AL点鼻薬の特徴

花粉やハウスダスト(室内のほこり)等によるアレルギーが増えています。鼻に起る症状は、鼻水、鼻づまり、くしゃみ等の不快な症状です。本剤は鼻水、くしゃみを緩和するクロルフェニラミンマレイン酸塩、鼻づまりを緩和するナファゾリン塩酸塩、殺菌作用のあるベンゼトニウム塩化物を配合しています。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

使用法

年齢	1回使用量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1~2度ずつ	1~5回鼻腔内に噴霧して下さい。 (適用間隔は3時間以上おいて下さい)
7歳以上15歳未満		
7歳未満		使用しないで下さい。

〈使用法に関する注意〉

- (1)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (2)7歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)点鼻用にのみ使用して下さい。

〈容器の使い方〉

- (1)使用前にいねいに鼻をかんで下さい。(あまりきつくかまないで下さい)
- (2)容器のキャップをとり、ノズルの先を軽く鼻腔内に入れ、薬液を1~2度噴霧して下さい。
- (3)使い初めは、液が噴霧するまで数回空押しして下さい。
- (4)ノズルを鼻腔から外に出してから指の力を抜いて下さい。(鼻腔内で力を抜くと、鼻水等が容器内に吸い込まれ、薬液が汚染される恐れがあります)
- (5)もう一方の鼻腔でも同じ操作を繰り返して下さい。
- (6)使用後は、清潔なティッシュペーパー等で拭いて、キャップを閉めて下さい。
- (7)薬液を噴霧させるため容器は空間を多くとっています。



成分・分量

本剤は、100mL中に次の成分を含有しています。

クロルフェニラミンマレイン酸塩	500mg
ナファゾリン塩酸塩	50mg
ベンゼトニウム塩化物	20mg
添加物：等張化剤	

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)他の人と共用しないで下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標



製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10