

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

頭痛・生理痛・歯痛に

第2類医薬品

Saridon[®]
サリドン[®] 顆粒

特納用

非ピリン系 解熱鎮痛薬

サリドン顆粒の特徴

1. 解熱鎮痛成分(アセトアミノフェン、エテンザミド)の作用によってすぐれた効き目を発揮し、不快な自覚症状をはやくとります。
2. 胃にやさしい胃粘膜保護成分グリシンを配合しています。
3. ねむくなる成分は含まれておりません。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3. 服用前後は飲酒しないで下さい。
4. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)
 - (4) 高齢者
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 次の診断を受けた人：心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- 頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉(いんこう)痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
- 悪寒(おかん)・発熱時の解熱

用法・用量

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。 (服用間隔は6時間以上おいて下さい)
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	
3歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)3歳以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

本剤は、淡緑色の顆粒で、1包(1.0g)中に次の成分を含有しています。

アセトアミノフェン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300mg

エテンザミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 380mg

無水カフェイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75mg

グリシン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60mg

添加物：トウモロコシデンプン、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、グリチルリチン酸2K、

銅クロロフィリンNa、二酸化ケイ素

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10