



* 1 2 0 2 A 0 2 *

2012年2月改訂 第2版
(記載要領変更に伴う改訂)ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように添付文書を大切に保管してください。

消炎鎮痛ゲル剤

肩こり・筋肉の痛みに!

第2類医薬品

コランデスアルファゲル

特長

- ・コランデス α ゲルは、痛みやはれのもとに直接作用するフェルビナク3.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。
- ・フェルビナクは、患部で痛みや腫れに関係する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- ・ゲルタイプでべたつかず、サラツとした使用感で「スーツ」と患部に浸透していきます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等または化膿している患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

3.5 ~ 6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み


【成分・分量】 本品100g中 フェルビナク……………3.0g
添加物としてエタノール、カルボキシビニルポリマー、*l*-メントール、ジイソプロパノールアミン、香料を含有する。

【用法・用量】 1日2～4回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (2) ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量を守ってください。

〈使用方法〉



【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 火の中に入れてください。
- (6) 使用済みの容器は火中に投じないでください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべくすみやかに使用してください。
- (8) 使用後はキャップをしっかり締めてください。

本製品について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元 **白金製薬株式会社**
〒634-0803奈良県橿原市上品寺町515

製造販売元 **ダイヤ製薬株式会社**
〒634-0803奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室TEL:0744-21-5588
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)