

使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。



のどの痛み・はれ、声がれに

# パブロントローチAZ

第3類医薬品

(口腔咽喉薬)

- ◆かぜをひいた時、のどの炎症は不快なものです。また、気候の変化、大気汚染、タバコ等は、いずれものどの粘膜を刺激して、炎症を起こす原因となります。のどの炎症は、痛みやはれ等の不快な症状を起こすばかりでなく、いろいろな余病を起こすもとにもなりますので、早めのお手当が大切です。
- ◆パブロントローチAZは、抗炎症剤 アズレンスルホン酸ナトリウム・グリチルリチン酸二カリウムと殺菌剤 セチルピリジニウム塩化物水和物を配合したトローチ剤で、炎症を効果的にしずめ、のどの不快な症状を改善します。



## 使用上の注意



### 相談すること



- ① 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- ③ 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください


## 効能

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・声がれ・のどの不快感、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去



## 用法・用量

次の量をかまずに口中でゆっくり溶かしてください。

年齢	1回量	1日使用回数
15才以上	1錠 	4～6回
5～14才		2～3回
5才未満	使用しないこと	

### [注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)かみくだいたり、のみこんだりしないでください。

## 成分

1錠中

成分	分量	はたらき
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.8mg	口腔内の粘膜に直接作用し、炎症を効果的にしずめます。
グリチルリチン酸二カルシウム	2.5mg	抗炎症作用により、のどの炎症をしずめます。
セチルピリジニウム塩化物水和物	1 mg	口腔内を殺菌・消毒します。

添加物：白糖、果糖、ホビドン、*l*-メントール、シヨ糖脂肪酸エステル、香料

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室  
電話 03-3985-1800  
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発売元

大正製薬株式会社  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

日東薬品工業株式会社  
京都府向日市上植野町南開35-3

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)