

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

# 血行を良くし、コリ・痛みをやわらげる 第3類医薬品 **LION** **ハリックス55 EX 温感A**

**微香性** 鎮痛消炎パップ剤

## 特長

### 1. ダブル消炎効果で、肩こり・腰痛などの症状に優れた効き目を発揮。

サリチル酸グリコールに加え、抗炎症成分グリチルレチン酸を配合。患部の症状を鎮め、痛みをやわらげます。

### 2. 温熱感が素早く立ち上がり、あたたかい貼り心地が持続します。

有効成分トウガラシエキスが患部の血流を促進し、心地よい温熱感とともに、コリや痛みをやわらげます。

### 3. 有効成分の浸透性に優れ、しかも肌にやさしい。

弱酸性・高含水基剤を採用しています。

### 4. 身体の動きにピタッと密着する全方向伸縮自在ニット支持体を採用し、はがれにくい。

※1度貼って上手に貼れなかった場合に貼りなおしができ、はがれにくくなっています。



関節部にもピタッと貼れます

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



## 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効能** 腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫(ねんざ)、骨折痛、しもやけ

**用法・用量** 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1~2回貼付してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3) 本剤の使用により、とくに強いかゆみや痛みが出た場合には使用を中止してください。
- (4) 打撲、ねんざには、はれがひいてからご使用ください。
- (5) 貼ったまま入浴するとまれに刺激を感じることがありますから、少なくとも入浴の1時間前にはがしてください。また、入浴後は30分位してからお貼りください。
- (6) 汗をかいたり、患部がぬれているときはよく拭きとってからお貼りください。
- (7) 患部の広さに応じ、フィルムの上から適当な大きさに切ってご使用ください。

### 成分 膏体100g(1000cm<sup>2</sup>)中

有効成分	分量	はたらき
サリチル酸グリコール	2.0g	炎症、痛みをおさえます。
グリチルレチン酸	0.05g	炎症をおさえます。
トウガラシエキス (原生薬換算量1.0g)	0.02g	血流を改善します。
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	血流を改善します。

添加物として、香料、ポリソルベート80、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、グリセリン、プロピレングリコール、エドト酸Na、pH調整剤、その他2成分を含有。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと二重に折りまげて外気にふれないようにしてください。
- (5) 使用期限(箱、袋に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

#### お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター (電話:0120-813-752)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

Analgesic & Anti-inflammatory Cataplasm

