

# ムヒDC<sup>®</sup> 速溶錠

販売名:ムヒDC速溶錠

犬、ネコ、ウサギ、鳥などの動物がいると、「かゆみ」「鼻炎（くしゃみ・鼻水）」などの症状が出てしまう「動物アレルギー」の方に。

「ムヒDC速溶錠」は、1回1錠。どこでも水なしですばやく飲んで、つらい動物アレルギーの「かゆみ」にも「鼻炎（くしゃみ・鼻水）」にもしっかり効きます。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)フェニルケトン尿症の人。(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有するため。)

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等）。

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

#### 4. 長期連用しないでください

#### 5. 服用前後は飲酒しないでください

### 相談すること



#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人。
- (4)高齢者。
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の症状のある人。  
排尿困難
- (7)次の診断を受けた人。  
緑内障

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、腹痛
精神神経系	頭痛、ふらふら感
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
血小板減少	血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
□のかわき、眠気。
- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

しっしん・かぶれによるかゆみ、鼻炎、じんましん

## 用法・用量

成人（15才以上） 1回1錠、1日2回（朝・夕）かむか、口中で溶かして服用してください。  
15才未満の小児には服用させないでください。

### <用法・用量に関連する注意>

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)錠剤の取り出し方

右図のように、錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押して、裏面の膜を破り、錠剤を取り出して服用してください。（誤ってシートのまま飲みこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



## 成分とそのはたらき

成人1日量（2錠）中、次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	は た ら き
メキタジン	4 mg	抗アレルギー作用により、皮ふのかゆみや鼻炎をしっかり抑えます。

添加物としてD-マンニトール、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、タンニン酸、スクラロース、クロスポビドン、アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、クエン酸、ℓ-メントール、ステアリン酸Mg、香料を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 使用期限（ケースに西暦年と月を記載）をすぎた製品は服用しないでください。

## お手当のポイント

☆動物アレルギー症状として、息苦しさ、全身倦怠などの症状が見られた場合は、医師の診療を受けてください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地  
☎ 076-472-0911（電話受付時間：月～金（祝日を除く）9：00～17：00）

発売元 **MUHI** 株式会社 池田模範堂 製造 販売元 **TS** テイカ製薬株式会社  
富山県中新川郡上市町神田16番地 富山県富山市荒川一丁目3番27号

®登録商標  
T19-12 TT01