



洗口うがい剤
ポピクル G

第3類
医薬品

 使用上の注意

 してはいけないこと

次の人は使用しないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ヨードに対し過敏症の既往歴のある人。
- (3) 甲状腺疾患のある人。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 口内のただれがひどい人。
- (5) 妊婦、妊娠していると思われる婦人又は授乳中の婦人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 本剤の使用後又は使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
口	あれ, しみる, 灼熱感, 刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

- (2) 5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合。

【効 能】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法・用量】

1回、本剤2～4mLを水約60mLに薄めて、1日数回うがいをしてください。

用法及び用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ること。
- (2) うがいのみで使用し、内服しないこと。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

【成分・分量】(本品 100mL 中)

成分	含量	はたらき
日局ポビドンヨード	7g(有効ヨウ素 700mg)	のどを殺菌消毒します

添加物：エタノール、グリセリン、ヨウ化カリウム、サッカリンナトリウム、L-メントール

成分及び分量に関連する注意

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 衣服などに付着した場合、水か洗剤でなるべく早く洗い落とすこと。
- (5) 火気に近づけないこと。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

お問い合わせ先

製造販売業者



共立薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷 1085 番地

お客さま相談室 ☎0744-52-4741

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎0120-149-931(フリーダイヤル)