

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



乾燥性皮膚炎治療薬

第2類医薬品

HP+ LOTION HPローション

特 徴

カサカサ荒れ肌、子どもの乾燥肌を治す

有効成分「ヘパリン類似物質」は、優れた保湿力を有するだけでなく、乾燥による炎症や肌荒れなどのくり返す皮膚トラブルも治療し、滑らかで健康な状態へ導きます。

ヘパリン類似物質【3つの作用】



1 保湿

皮膚の水分保持力を向上するとともに、皮膚のバリア機能を改善し、異物の侵入を防ぎます。

2 血行促進

血流を良くすることで、皮膚の新陳代謝を高め、再生を促進します。

3 抗炎症

炎症により見えた目が気になる荒れた皮膚症状を鎮め、正常な状態へ導きます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、紫斑病など）の人は使用しないでください。（血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります。）
2. 次の部位には使用しないでください。
目や目の周囲、粘膜（口腔、鼻腔、膈など）

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、
乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ（ただれを除く）、
きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり（顔面を除く）、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのぼして貼ってください。

<用法・用量に関する注意>

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 2. 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、異常があるときは医師にご相談ください。
 3. 外用にのみ使用してください。
- ※出血のある傷口には使用しないでください。（血が止まりにくくなることがあります。）
※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

成分

100g中

ヘパリン類似物質・・・0.3g

添加物:カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、
1,3-ブチレングリコール、グリセリン、トリエタノールアミン、パラベン

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して立てて保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
4. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

【お問い合わせ先】

- (1) 購入した薬局・薬店
- (2) グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
お客様相談室
【電 話】03-5786-6315
【受付時間】9:00～17:00（土、日、祝日を除く）
- (3) 上記以外の時間で、誤飲、誤用、過量使用等の緊急のお問い合わせは下記機関もご利用いただけます。
連絡先:公益財団法人 日本中毒情報センター 中毒110番
電 話:072-727-2499（24時間、365日対応）

HPローション製品に関する情報はこちら <http://www.hp-cream.jp/>

製造販売元

ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168番地

発売元

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社
東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目6番15号