




おなかの皮下脂肪が多く便秘がちな方の肥満に、脂質代謝を上げて余分な脂肪を分解・燃焼して減らします。



吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

販売名：「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスEX錠 漢方製剤 **第2類医薬品**

チャック

⚠ 使用上の注意

- ❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤)
 2. 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人 むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢、便秘
4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[成分] 成人1日の服用量12錠(1錠390mg)中

防風通聖散エキス(3/5量).....3,420mg
トウキ・シャクヤク・センキョウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ・マオウ各0.72g、シヨウキョウ0.24g、ダイオウ0.9g、無水ポウショウ0.45g、ヒャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1.2g、カッセキ1.8gより抽出。

添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、還元麦芽糖水アメ、マクトゴール、酸化チタン、黄色三酸化鉄、三酸化鉄、カルナバロウを含有する。

[保管及び取扱い上の注意] (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりしめて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わります。)(4) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。(5) 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元 **クラシエ 薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)
ホームページ www.kracie.co.jp



製造番号

使用期限

PE、金属

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **クラシエ 製薬株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931

20537 H01