

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

### サマレスゼリー (竹葉石膏湯)の働き

サマレスゼリーは、漢方処方「竹葉石膏湯」を配合した医薬品です。  
7種類の生薬の働きで、**身体にこもった余分な熱を下げ、熱により不足した潤いを補いながら、軽い熱中症や口の渇きなどの症状を改善します。**



### 熱中症とは

高温、多湿などの環境下では、身体から外気への熱放散が減少し、汗の蒸発も不十分となります。  
その結果、体内の水分・塩分が不足し、血液の流れが低下する為、**身体に熱がたまり**体温上昇などが起こります。これにより発症する障害を総称して熱中症と呼びます。

#### 【軽い熱中症の諸症状】



第2類医薬品

# かるい熱中症、口渇に

### 軽い熱中症の諸症状

- 大量の発汗
- めまい・立ちくらみ
- 筋肉痛・こむら返り

### 口渇(のどや口の渇き)

体力虚弱で、かぜが治りきらず、たんが切れにくく、ときに熱感、強いせきこみ、口が渇く方



Kracie 第2類医薬品

熱感を伴う諸症状に

# サマレスゼリー

携帯に便利なスティックタイプ

水なしで  
すぐに飲める

プラム味

4包

### △使用上の注意

<b>相談すること</b>	<p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸虚弱で冷え症の人 (5) 高齢者 (6) 次の症状のある人 むくみ (7) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>				
<b>関係部位</b>	消化器				
<b>症状</b>	食欲不振、胃部不快感				
<b>状態</b>	まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 <table border="1"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>症状の名称</b></td> <td style="width: 50%;"><b>状態</b></td> </tr> <tr> <td>偽アルドステロン症、ミオパチー</td> <td>手足のだるさ、しびれ、つばり感やこむら返りに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。</td> </tr> </table>	<b>症状の名称</b>	<b>状態</b>	偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこむら返りに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
<b>症状の名称</b>	<b>状態</b>				
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこむら返りに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。				

3. 1ヵ月位(からせき)に服用する場合には5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

20g × 4包

押し開ける

第2類医薬品

漢方製剤

販売名: サマレスゼリー

〈成分〉1日の服用量3包(1包20g)中  
竹葉石膏湯エキス...2.0000mg

〔チクヨウ・カンゾウ各1.0g、セッコウ5.0g、ハンゴ2.0g、バクモンドウ・コウベイ各3.0g、ニンジン1.5gより抽出〕

添加物として、クエン酸Na、カラギーナン、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、dl-リンゴ酸、キサンタンガム、カロブピニンガム、シクロデキストリン、白糖、スクラロース、タウマチン、香料、エタノール、バニリンを含有する。

#### 〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスをうけていますので、ゼリーの色が多少異なることがあります。

#### 〈効能〉

体力虚弱で、かぜが治りきらず、たんが切れにくく、ときに熱感、強いせきこみ、口が渇くものの次の諸症: からせき、気管支炎、気管支ぜんそく、口渇、軽い熱中症

#### 〈用法・用量〉

1日3回食前又は食間に口の中でゼリーをくずして服用。  
成人(15才以上)及び7才以上の小児...1回1包  
7才未満は服用しないこと

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2) 開封後はすみやかに服用してください。(3) 1回1包飲みきりですので、分割服用しないでください。(4) 開封時及び服用時、中身の飛び出しにご注意ください。(5) 切り取り部分で唇を切らないようにご注意ください。(6) 服用時、薬剤がのどにつかえることのないようご注意ください。

#### 〈保管及び取扱上の注意〉

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

#### 〈服用方法〉



- (1) 分包装を立て、開け口から切れ目にそって切り取ってください。
- (2) 切り口をくわえ、指でしぼり出すように服用してください。

発売元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20

(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水1269

(〒635-0103)

お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎ 0120-149-931

18273