

ご使用に際して、外箱の説明文を必ず
お読みください。また、必要な時に読める
ように大切に保管してください。

第2類医薬品

販売名：葛根湯液Ⅱクラシエ

〈成分〉

成人1日の服用量90mL(45mL×2本)中

葛根湯エキス.....3,200mg

(カッコン4g、マオウ・タイソウ各3g、ケイヒ・シャクヤク・
カンゾウ各2g、ショウキョウ1gより抽出。)

添加物として、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒ
マシ油、ソルビタン脂肪酸エステル、パラベン、クエン酸Na、
エタノール、安息香酸Na、白糖、ポビドン、シリコン樹脂、
グリセリン脂肪酸エステル、CMC-Na、リン酸、アセスル
ファムK、スクラロース、香料を含有する。

〈効 能〉

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかくて
いないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

〈用法・用量〉

成人(15才以上)1回1本、1日2回朝夕、食前又は食間によく
振ってから服用する。

15才未満は服用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあります。
よく振ってから服用してください。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が
変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しな
いでください。
- (5)ピンをあげたら飲みきってください。
- (6)ピンをあげたまま保存しないでください。

製造

番号

使用

期限

発 売 元
クラシエ 薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)
ホームページ www.kracie.co.jp
お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間
10:00～17:00(土、日、祝日を除く)
製造販売元
クラシエ株式会社
東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)
副作用被害救済制度の問合せ先
☎0120-149-931

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談
してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
(4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人
(6) 高齢者
(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こ
したことがある人
(8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性
があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は
直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわ ばり(こわえて)、脱力感、筋肉痛があらわれ、 徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が 黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲 不振等があらわれる。
多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の 赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み 等が持続したり、急激に悪化する。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合に
は5～6回)服用しても症状がよくなりない場合は服用
を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください